บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

บัตรประจำตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS ALERT CARD)

ชื่อผู้ป่วย_____สิ่งที่แพ้_____

สิ่งที่ต้องทำทันที เมื่อเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง

ฉีดยา epinephrine ที่ต้นขาด้านนอก "ทันที"

☐ ชนิดถูกเตรียมขึ้นพร้อมใช้ ขนาด_____ซีซี

☐ ชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ขนาด_____มก.

ยาอื่น ๆ _____

ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร _____

ฉุกเฉินติดต่อ 1._____โทร_____

2._____โทร_____

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **

อาการที่บ่งบอกว่าเกิดการแพ้ชนิดรุนแรง
(ANAPHYLAXIS SYMPTOMS)

ผิวหนัง	คัน ลมพิษ บวม แดง
ปาก	คันริมฝีปาก และ/หรือ ลิ้นบวม
คอหอย	คัน จุกแน่นในลำคอ เสียงแหบ
ปอด	หายใจเหนื่อยหอบ ไอ หายใจเสียงหวีด
หัวใจ	ชีพจรเบา วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
ทางเดินอาหาร	อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง

** อาการแสดงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพบทั้งหมด อาจพบอาการแสดงเพียงบางอาการได้ **